

*LISTE DES MAMMIFÈRES RAPPORTÉS PAR M. GUY BABAULT  
DU BRITISH EAST-AFRICA,*

PAR M. MAX KOLLMANN.

Au cours d'un voyage dans l'Afrique orientale anglaise, M. G. Babault a récolté un assez grand nombre de Mammifères que nous avons déterminés. Cette collection ne contient pas de formes nouvelles et on ne saurait s'en étonner, la faune de cette partie de l'Afrique étant aujourd'hui assez bien connue. Mais elle comprend un certain nombre de spécimens intéressants, notamment une très belle Girafe dont M. Babault a fait don au Muséum, et qui sont venus augmenter heureusement nos collections.

Voici dans l'ordre systématique les espèces recueillies avec leur indication d'origine.

**PRIMATES.**

*CERCOPITHECUS ALBIGULARIS* Sykes. — Espèce très largement répandue dans l'Afrique occidentale, tropicale, orientale et jusque dans la région de Mozambique.

**CHIROPTÈRES.**

*MEGADERMA FRONS* E. Geoff. — Narrosurra River.

**INSECTIVORES.**

*ERINACEUS ALBIVENTRIS* Wagner. — Narrosurra River.

*MACROSCELIDES FUSCUS* Peters. — Narrosurra River, Siswa, Guasso Nyero, Salt Marsh. Se rencontre surtout dans l'Afrique orientale, depuis le British East-Africa jusqu'au Mozambique,

*CROCIDURA NIGROFUSCA* Mastchie. — Kiali. Espèce très voisine de *C. Martensi* Dobs, de l'Afrique australe, mais cependant bien distincte. Elle a été récoltée jusqu'ici dans le British East-Africa, et le Deutsch Öst-Africa. Nous l'avons également rencontrée dans les collections rapportées par MM. Alluaud et Jeannel du Kilimandjaro <sup>(1)</sup>.

*CROCIDURA GRACILIPES* Peters. — Narrosurra River. Localisée dans l'Afrique orientale.

<sup>(1)</sup> M. KOLLMANN, Note sur les Mammifères rapportés de l'Afrique orientale par MM. Alluaud et Jeannel (*Bull. Mus.*, 1913, p. 138).

**CARNIVORES.**

*ZORILLA ZORILLA* Gm. — Narrosurra River.

*CANIS MESOMELAS* Schreb. — Amarla Valley, Narrosurra River, Guasso Nyero. Se rencontre depuis le Cap jusqu'à l'Abyssinie; très voisin de *C. variegatus* de l'Abyssinie et de l'Égypte.

*HYÆNA CROCUTA* Erxl. — Athi-plain.

*GENETTA* sp. — La variabilité extraordinaire des diverses espèces de Genettes est telle que, malgré l'aide du travail de Matschie<sup>(1)</sup>, nous n'avons pu déterminer les deux spécimens de cette collection.

*HERPESTES ALBICAUDUS* G. Cuv. — Nairobi.

*H. GRACILIS* Rüpp. — Salt Marsh. Répandu dans l'Afrique tropicale et méridionale.

*CROSSARCHUS FASCIATUS* Desm. — Narrosurra River, Amala River. Même distribution géographique que la précédente.

*FELIS CAFFRA* Desm. — Cette espèce est très voisine de *F. caligata* Bruce, si même elle en doit être distinguée; ainsi comprise, cette espèce est répandue depuis le Maroc, l'Algérie, jusqu'à l'Afrique centrale en passant par l'Égypte, l'Abyssinie, l'Afrique orientale allemande et anglaise, le Mozambique.

**RONGEURS.**

*SCIURUS CEPAPI* A. Smith. — Nairobi.

*GERBILLUS BOEHNI* Noack. — Narrosurra River, Siswa. Localisée en Afrique orientale et centrale.

*OTOMYS IRRORATUS* (Brants). — Nairobi, Amarla River.

*ARVICANTHIS BARBARUS* (L.). — Amarla River, Siawa.

*A. NEUMANNI* Matschie. — Salt Lake, Siawa, Salt Marsh. Localisée en Afrique orientale.

*MUS NATALENSIS* A. Smith. — Narrosurra River, Siswa, Salt Marsh, Kijabi. Afrique orientale et australe.

*CRICETOMYS GAMBIANUS* Waterh.

*TACHYORYCTES SPLENDENS* Rüppel. — Nairobi. Localisé en Abyssinie et Afrique orientale allemande et anglaise.

*MYOSCALOPS ARGENTEO-CINEREUS* (Peters). — Narrosurra River, Afrique orientale jusqu'au Mozambique.

(1) *Verhandl. v. internat. Zool. Congress*, 1901, p. 1128.

*PEDETES CAFFER* Pallas. — Localisé dans l'Afrique orientale et méridionale.

*LEPUS CAPENSIS OCHROPUS* Wagner. — Semmick Valley, Siswa. Répandu dans toute l'Afrique centrale et orientale.

#### PROCAVIIDÉS.

*PROCAVIA BRUCEI* (Gray). — Nyero. Se trouve dans l'Afrique orientale et australe.

*P. SCHEELEI* Matschie. — Siswa. Afrique orientale et centrale.

#### ONGULÉS.

*BUBALIS TORA* Gray. — Siswa, Narrosurra River. Afrique orientale.

*COUNOCHETES ALBOJUBATUS* Thom. — Guasso Nyero. Afrique orientale jusqu'au Victoria Nyanza.

*GAZELLA GRANTI* Brooke (? *G. g. ROBERTSI* Thomas). — Afrique orientale, depuis l'Abyssinie méridionale jusqu'à Zanzibar. La sous-espèce *Robertsii* se trouve au Deutsch Ost-Africa.

*G. THOMSONI* Günther. — Guasso Nyero. Plus étroitement localisée que la précédente en Afrique orientale (région du lac Rodolphe, Kilimandjaro, etc.).

*ÆPYCEROS MELAMPUS* Lichtenstein. — Amarla River, Narrosurra River, Lemmick Valley. Se trouve surtout dans l'Afrique australe, mais remonte çà et là dans l'Afrique orientale.

*DAMALISCUS JIMELA* Matschie. — Amarla River. Caractéristique de l'Afrique orientale.

*GIRAFFA CAMELOPARDALIS ROTHSCHILDI* Lydekker. — Salt Marsh. Mâle très âgé; cet individu appartient certainement à la sous-espèce *Rothschildi*, dont il présente les caractères essentiels : trois cornes ; partie inférieure des jambes blanc pur non tacheté ; une aire triangulaire blanche au voisinage de l'oreille ; extérieur des oreilles blanc ; ligne blanche autour du cou très étroite. Les taches sont grandes et ont une tendance à se découper en forme de feuille. Dans l'individu qui nous occupe, cette découpe est très accentuée sur certaines taches du cou qui sont presque complètement divisées en deux. Dans l'ensemble, les taches sont plus découpées que celles de l'individu figuré par M. de Rothschild et H. Neuville<sup>(1)</sup>. Mais on sait d'après Lydekker que ce caractère s'accroît avec l'âge.

<sup>(1)</sup> M. DE ROTHSCHILD et H. NEUVILLE, Recherches sur l'Okapi et les Girafes de l'Est Africain (*Ann. Sc. nat.*, 9, 12, 1911, p. 1).